

# Nytt om finnmarkspors *Ledum palustre* i Østfold

NILS ORDERUD & GEIR HARDENG

Orderud, N. & Hardeng, G. 2000. Nytt om finnmarkspors *Ledum palustre* i Østfold. *Natur i Østfold* 19(2): 157-159.

Finnmarkspors er funnet på 3 nye lokaliteter i 1998-2000: Evenbymosen og Trytjerna i Marker, samt Myråsmosen i Trøgstad. På tre andre lokaliteter Abbotjern i Marker, Søndre Bergtjern i Aremark og Toverød i Våler, alle før ansett som verneverdig er forekomsten ved Toverød, Våler utgått pga. grøfting. På Ekebergmosen, Trøgstad er artens status bedre enn tidligere anført.

*Nils Orderud, Skogly, 1859 Slitu*

*Geir Hardeng, Fuglevik platå 19, 1673 Kråkerøy*

## Sjelden i Sør-Norge

Finnmarkspors hører med blant de østlige artene i Norge. I Sør-Norge regnes den som sjelden. De fleste funn er gjort i grensebygdene mot Sverige, fra Idd i Østfold til Trysil i Hedmark (Lid & Lid 1994). En oversikt over kjente forekomster av arten i Østfold er nylig presentert av Hardeng (1998, 1999). I denne oversikten presenteres nye opplysninger om finnmarkspors i Østfold.

## Nye lokaliteter

### *Trytjerna, Marker*

Finnmarkspors ble funnet ca. 95 m sørvest for SØ Trytjern, 246 m o.h. den 9.6.1998 av Ola M. Wergeland Krog og G. Hardeng. Forekomsten dekket ca 30 x 30 m, med et større (8 x 8 m) og noen andre små forekomster. Bestanden var livskraftig, og var i fin blomstring da det ble funnet.

### *Evenbymosen, Marker*

Funnet ble gjort sørvest i en liten ugrøftet furumyr like sør for Lintjern 25.8.2000 av Kåre Homble og G. Hardeng. Denne myra ligger ca. 150 m o. h. Bestanden har god vitalitet og mange fertile skudd som var avblomstret på funntidspunktet. Arten ble funnet i et område på ca 25 m<sup>2</sup>. En noe større myr like sør for finnmarksporsmyra var helt utgrøftet.

### *Myråsmosen, Trøgstad*

Sammen med Ellen Aubert, finneren av bestandet av finnmarkspors, foretok Nils Orderud den 12. juli 2000 en tur for å se på forekomsten. Myråsmosen ligger ca. 400 m sør for Skottasjøen i Hera-vassdraget. Mosen må betegnes som en artsfattig, tydelig hvelvet nedbørsmyr. Det finnes spor etter torvtekter i den sydlige delen. For øvrig er mosen helt omkranset av barskog.

Bestanden av finnmarkspors ligger i den nordøstlige ytterkant av mosen. Omfanget av forekomsten er ca 2,5 x 3 m med innslag av blokkebær og røsslyng. Bestanden får mye lys fordi bare småfuruer omkranser dem. Det er tettere skog i bakgrunnen. Finnmarksporsen virket frisk og vital og ser ikke ut til å være truet av noen art.

## Nye opplysninger

### *Søndre Bergtjern, Aremark*

Finnmarkspors ble funnet her i 1844 av Hans Christian Printz, men har ifølge pollenanalyser vært her i ca 4.000 år. Arten finnes fortsatt N i tjernet pr. juni 1999 (G. Hardeng). Fylkesmannens miljøvernavdeling har i brev av 9.8.1999 informert grunneier og skogbrukssjefen i Aremark om lokaliteten, med oppfordring om ikke å grøfte forekomsten. Se og Hardeng (1997:35 og 1998:35).



Fig. 1. En liten, men livskraftig, forekomst av finnmarkspors ble nyoppdaget på Myråsmosen i Trøgstad sommeren 2000. Foto: Nils Orderud

#### *Abortjern, Marker*

Ved Abortjern finnes store livskraftige forekomster av finnmarkspors spredt rundt ved tjernet og ble sist sett av Ola M. Wergeland Krog, G. Hardeng juni 1999. Mulig er dette Sør-Norges største forekomst (ref. fargefoto, omslag Blyttia nr. 1, 1998). Ny skogbilvei bygget sørfra Skinnarbutjern slutter øst for Ruketjern, noen 100 m vest for tjernet. Fylkesmannens miljøvernnavdeling har i brev av 9.8.1999 informert grunneierne, bl.a. Norske Skog og skogbrukssjefen i Marker/Rømskog om lokaliteten, med oppfordring til ikke å grøfte forekomsten. Norske Skog svarer i brev av 20.8.1999 at lokaliteten "vil bli hensyntatt i de landskapsøkologiske planer som er vedtatt utarbeidet" på deres eiendommer. Se og Hardeng (1997:37-38 og 1998:35-37).

#### *Toverød, Våler*

Finnmarkspors ble sist registrert på denne sin aller vestligste lokalitet i Østfold i 1988, men ble vurdert som utgått i 1998 pga grøfting angivelig i 1996 (Per og Anne Marie Raade meddelt; jfr. Hardeng 1997:40; 1998:35-36).

#### *Ekebergmosen, Trøgstad*

Finnmarkspors ble sett i spredte felter innen et ca 70 x 100 m stort areal sørøst på Ekebergmosen den 12.4.1998 av Nils Orderud. Grupper med busker innenfor 1 til 6 m i diameter. God fertilitet, ikke i tilbakegang (ref. Hardeng 1997:40; 1998:36). Spredt bjørk, gamle torvtekter fra 1940-tallet. Forekomsten ble igjen sett i rik blomstring juni 1999 og februar 2000 (Nils og Ingrid Orderud).



Fig. 2. Finnmarkspors i blomst på Myråsmosen i Trøgstad. Foto: Nils Orderud

#### Lokalitetsdata

- Aremark, Søndre Bergtjern, PL 503 789, sist sett juni 1999.
- Marker, Abortjern, PL 553,837, sist sett juni 1999.
- Marker, Evenbymosen, PM 466,128, SV i en liten ugrøftet furumyr litt S for Lintjern, 25.8.2000, Kåre Homble og G. Hardeng.
- Marker, Trytjerna, PM 474, 147, Ca 95m SV for SØ Trytjern, 246 m o.h. den 9.6.1998, Ola M.Wergeland Krog og G.Hardeng.
- Trøgstad, Myråsmosen v/Kalsrud, PM 349 132 (WGS84), 1914 ll, 130 m o.h. 12/7-2000. på nedbørsmyr, Ellen Aubert & Nils Orderud. Belegg sendt Botanisk museum, Oslo.
- Ekebergmosen, Trøgstad, PM 263,114, sist sett februar 2000.
- Toverød, Våler, PL 029,906, sist sett 1988, ikke gjenfunnet ved besøk 1998.

#### Takk

til Ellen Aubert for rapporten om forekomsten med finnmarkspors på Myråsmosen.

#### Litteratur

- Hardeng, G. 1997. Voksesteder for finnmarkspors *Ledum palustre* i Østfold. *Natur i Østfold 16*: 34-41.
- Hardeng, G. 1998. Utbredelse og forvaltning av finnmarkspors, *Ledum palustre*, i Østfold. *Blyttia 56*: 25-38.
- Lid, J. & Lid, D.T. 1994. *Norsk flora*. 6. utg. v/ R. Elven. Det norske samlaget, Oslo. 1014s.