



RETURADRESSE:

Blyttia,
Naturhistorisk museum,
Postboks 1172 Blindern,
NO-0318 Oslo

BLYTTIA 84(2) – NR. 2 FOR 2026:

NORGES BOTANISKE ANNALER

- Eirin Bruholt og Kristina Bjureke: Plantenes fremtid er bankers: Ti år med spiretester ved Nasjonal frøbank for truede arter 74 – 80
- Hanne Sickel, Christian Pedersen, Wendy Fjellstad, Wenche Dramstad og Jutta Kapfer: Jordbrukslandskapets «mellomrom» – hvordan står det til med blomsterressursene? 81 – 92
- Geir Gaarder, Ivar Heggelund, Oleif Johnsen, Stein Erik Lunde og Jan Ole Olsen: Den arktiske floraen i Kåffjordfjellene i Troms 93 – 106
- Alf Harry Øygarden, John Inge Johnsen, Rolf Meling, Lars Dalen og Trond Høy: Mispelslekta *Cotoneaster* i Norge. I. Underslekta *Chaenopetalum* 107 – 117
- Steinar Skrede og Mikael Hedrén: Hybridisering mellom *Dactylorhiza* og *Gymnadenia* (Orchidaceae) i Skandinavia 118 – 135

SKOLERINGSSTOFF

- Sigrid Skrivervik Bruvoll: Årets mose 2026 – labbmose *Rhytidium rugosum* 72 – 73

NORSK BOTANISK FORENING

- Kaisa Ervik Øverland: Leder. Artskyndige er på rødlista, og Ung Botaniker er på saken! 71 – 72
- Petter Oksum Eriksen: Vestfold Botaniske Forening opprettet! 106

ANNONSE

- I beit for ei plantepresse? 72

Forsidebilde: Kantsoner og restarealer i landskapet, «mellomrommene» mellom brukte arealer, er ekstremt viktige for artsmangfoldet – både plantearter og insekter, og alle arter som er avhengige av dem igjen. Hanne Sickel og medforfattere (s. 81) har sammenliknet artsmangfoldet i slike «mellomrom» nå med en tilsvarende undersøkelse 18 år tidligere. Sammenlikningen viser en merkbar nedgang i artsmangfold. Likevel finnes det fortsatt artsrike og verdifulle kant- og resthabitater, og veikanter står fram som de mest diverse. Forfatterne påpeker viktigheten av tiltak for å ivareta artsmangfoldet i slike habitater, blant annet fjerning av invasive arter og riktig slått. Forsidebildet viser blomsterfluer *Syrphidae* i kø til matfatet (ugrasbalderbrå *Tripleurospermum inodorum*). Foto: Jutta Kapfer.

Cover photo: Margins and leftover areas, «the green inbetween» various used areas, are extremely important for the species diversity, both plant species, insect species and all the rest depending on them. Hanne Sickel and co-authors (p. 81) have compared the species diversity of such «inbetween areas» in our time to a similar study 18 years ago. The comparison shows a significant decline in species diversity. Nevertheless, there are still species-rich and valuable margin and leftover areas, and roadverges stand out as the most diverse. The authors point at the importance of carrying out measures to conserve the species diversity of such habitats, including removal of invasive species and mowing areas the right way. The cover photo shows hoverflies *Syrphidae* queuing for the feast (scentless mayweed *Tripleurospermum inodorum*). Photo: Jutta Kapfer.